


COMMENT SE PROTÉGER DE LA COQUELUCHE ?

LA **VACCINATION** EST
LE SEUL MOYEN DE SE PROTÉGER
DES FORMES LES PLUS GRAVES.



ENFANTS

✓ 2-3-4 mois ✓ 15 mois
✓ 5-6 ans



JEUNES

✓ 15-16 ans



FEMMES ENCEINTES

✓ 24-32 semaines



ADULTES

✓ Toute personne
n'ayant jamais été
vaccinée contre
la coqueluche

L'AVIQ À VOTRE ÉCOUTE



NUMÉRO GRATUIT

0800/16.061 - numerograttuit@aviq.be



WWW.AVIQ.BE

Retrouvez-nous aussi sur
les réseaux sociaux !



Numéro de dépôt légal D/2023/7646/29

CONTACTS UNIQUEMENT POUR LES PROFESSIONNELS

La Cellule de Surveillance
des Maladies Infectieuses de l'AVIQ



071/33.77.77
surveillance.sante@aviq.be



matra.sciensano.be

Avec la
collaboration de

sciensano
www.sciensano.be

LA COQUELUCHE

Maladie bactérienne à déclaration
obligatoire et à prévention vaccinale



Ed. responsable : F. Lannoy | Rue de la Rivelaïne 21, 6061 Charleroi



Wallonie
familles santé handicap
AVIQ

QU'EST-CE QUE LA COQUELUCHE ?

La coqueluche est une infection des voies respiratoires potentiellement grave causée par la bactérie *Bordetella pertussis*.

Une vaccination préventive est disponible.

Quelles sont les personnes susceptibles de développer une forme grave de la maladie ?

- Les **nourrissons** de moins de 6 mois ;
- Les nourrissons de **moins de 16 mois n'ayant pas reçu** 3 doses de vaccins ;
- Les nourrissons de **16 mois ou plus n'ayant pas reçu** 4 doses de vaccin ;
- Les personnes atteintes de **pathologies cardiaques** ou **pulmonaires chroniques** ;
- Les personnes **immunodéprimées**.



Comment peut-on être contaminé ?

La contamination se fait **par gouttelettes** lorsque l'on se trouve à moins de 2 mètres d'une personne malade qui tousse ou éternue.

La période d'incubation (délai entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes) est habituellement de **7 à 10 jours**.

Quels sont les symptômes ?

Les symptômes apparaissent en **3 phases**.



1. PHASE CATARRHALE

Un peu de fièvre, toux et nez qui coule

Durée : 2 semaines

Période **TRÈS CONTAGIEUSE**



2. PHASE PAROXYSTIQUE

Quintes de toux pouvant être suivies de nausées, vomissements et/ou une inspiration difficile. Chez le nourrisson, possibilité d'épisodes d'apnée.

Durée : 1 à 6 semaines

Période **MOINS CONTAGIEUSE**



3. PHASE DE CONVALESCENCE


Disparition progressive des symptômes

Durée : 1 à 3 semaines

Période **NON CONTAGIEUSE**

Comment diagnostique-t-on la coqueluche ?

Le diagnostic repose sur un **frottis naso-pharyngé** en phase catarrhale.



Quel est le traitement préconisé en cas de contamination ?

La personne malade est traitée par des **antibiotiques** lors des 3 premières semaines qui suivent l'apparition des symptômes.

Le risque de contamination disparaît après 5 jours de traitement complet.

Quelles sont les mesures à mettre en place en cas de contamination ?

- Éviction de l'école, de la crèche, du lieu de travail :
- ✓ **durant 5 jours si traitement** par antibiotiques,
- ✓ **durant 21 jours sans traitement.**
- Rester à distance des personnes à risque.
- Se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon, tousser ou éternuer dans un mouchoir ou dans votre coude, porter un masque dans les lieux fort fréquentés.

